Neurolinfomatosis.

Reporte de un caso clínico y revisión de la literatura.

Autores :

Dr. Carlos Noboa B. (Médico del Departamento de Neurología del Hosp. SOLCA Gquil).

Dr. Gerson Espinoza V. (Médico Residente de Medicina Interna del Hosp. SOLCA Gquil.).

Dra. María Poveda A. (Médico Residente de Medicina Interna del Hosp. SOLCA Gquil.).

Dra. Mónica Álvarez O. (Médico Residente de Anatomopatología del Hosp. SOLCA Gquil).

Abstracto:

Describimos a un paciente con neuropatía periférica sensora motora y neuropatía craneal debido a neurolinfomatosis y definida por la infiltración de nervios periféricos por células tumorales y hacemos una revisión de hallazgos en 39 pacientes previamente descritos a través de confirmaciones de autopsia de casos examinados dentro de los archivos del centro presbiteriano de Columbia. La causa de la neuropatía es desconocida. La asociación con estados de inmunodeficiencias sugieren una patogénesis mediada por virus posiblemente retrovirus.

Palabras claves: Neuropatía periférica, Neurolinfomatosis, Líquido cefalorraquídeo, Electromiografía, Polineuropatía.

Abstract:

We describe a patient with sensorimotor peripheral neuropathy and cranial neuropathy proven neurolymphomatosis defined by infiltration of peripheral nerves by tumor cells and review the findings in 39 previously reported patients. The cause of the neuropathy is not known. The association with immune-deficient states suggest virally mediated pathogenesis, possibly a retrovirus.

key word: Peripheral Neuropathy, Neurolymphomatosis

Introducción

En 1907 **Marek** describió una enfermedad en gallos orpingtong en donde los nervios periféricos habían sido infiltrados por linfocitos. Veintidos años más tarde Pappenheimer y colaboradores describieron acerca de la enfermedad descrita por Marek. Las características patológicas sobresalientes, como hemos visto, son infiltraciones linfocíticas de los nervios periféricos y asociadas frecuentemente, con crecimientos linfomatosos en otras situaciones.

En 1934 **Lhermitte y Trelles** usaron el término de neurolinfomatosis periférica humana para describir los hallazgos en un paciente con infiltraciones linfomatosas de los nervios periféricos. Pero ha habido un debate acerca de la propiedad de este término por ello nos hemos vistos inmersos dentro de este debate al estudiar al paciente que a continuación reportaremos.

Como antecedente examinamos la literatura y hallamos casos similares de infiltración linfomatosas de nervios reportada bajo títulos como: "Reticulosis del Sistema Nervioso", «Polirradiculoneuritis con Infiltrados Celulares», «Neuropatía Linfomatosas» y «Leptomeningitis Linfomatosas», por mencionar algunos.

Presentamos el caso de un paciente femenino de 35 años de edad, conocida por el servicio de oncología clínica del Instituto Oncológico de Guayaquil descrito en noviembre de 1994; con presencia de masa tumoral abdominal de 9 años de evolución. Sin detectarse adenovisceromegalias, se constata gran masa en hemiabdomen superior derecho, así como otra lesión tumoral a nivel de fosa iliaca izquierda.

Se realizó tratamiento de quimioterapia y de radioterapia y su diagnóstico fue comprobado con estudio histopatológico revelando Linfoma No Hodgkin estirpe de células B con expresión del marcador L-26 (Inh-b), al igual que estudio citológico de líquido cefalorraquídeo y electromiografía interpretadas como infiltración del sistema nervioso central.

Correspondencia y separatas:

Dr. Carlos Noboa B..

Servicio de Neuro Oncología.

ION-SOLCA

Av. Pedro Menéndez Gilbert (junto a la Atarazana)

Guayaquil-Ecuador

© Los derechos de autor de los artículos de la revista Oncología pertenecen a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA. Sede Nacional, Guayaquil - Ecuador

Reporte de caso clínico

Paciente femenino de 35 años de edad, sin antecedentes personales, ni familiares de importancia. Refiere que su cuadro clínico empezó hace 9 años, con crecimiento de masa tumoral en hemiabdomen superior derecho, así como otra lesión tumoral a nivel de fosa iliaca izquierda, no detectándose adenovisceromegalias. Se le realiza punción de aspirado con aguja

fin cuyo diagnóstico fue compatible con LNH-B, tratada con 8 ciclos de quimioterapia tipo Chop (Cyclophosphamide-Doxorrubicina-Vincristina-Prednisona). Luego de tac torax-abdominopelvico de control se encuentra presencia de masa supra e infraclavicular izquierda por lo que en consideración por antecedentes previos se decide tto con radioterapia 24 gy con dosis de fraccionamiento de 200 cgy/día

Pasados 4 meses de su cuadro clínico evolutivo y tto recibido refiere parestesias en el pie y marcha inestable. En los siguientes meses noto diplopía y disminución visual del ojo derecho con ptosis del párpado derecho. Los hallazgos incluyeron manifestaciones de un síndrome de **apex orbitario** derecho, fijación del globo ocular y pupila, ptosis, ceguera, ausencia de respuesta corneal y pérdida del sensorio en la distribución de división oftálmica del nervio trigemino. Otras anomalías incluyeron debilidad facial derecha, disartria, debilidad flácida distal severa de miembro inferior con fasciculación en los músculos de los brazos y de las piernas, disminución de la sensibilidad cutánea con distribución en calcetín y en guante, con ausencia de reflejos. Los reflejos maxilares se hallaban presentes pero no había signo de Babinski, Clonus ni signo cerebelares. La tomografía de cerebro mostró una masa orbital derecha que invadía el nervio óptico y los músculos extraoculares extendiéndose hacia el seno cavernoso derecho por lo que se programó tratamiento paliativo sobre encefalo hasta C2 y orbita con Co 60 en fraccionamiento de 300 cgy /día hasta 30 gy.

El fluido cerebro espinal contenía 38 linfocitos y 2 células polimorfonucleares, el contenido de proteínas era de 174 mg/dcl, con contenido normal de glucosa, citología positiva para células linfomatosas malignas. Por lo que recibió 12 dosis de quimioterapia intratecal por 6 ciclos con la administración de arabinosido de citocina.

Los estudios de conducción nerviosa mostraron la pantorrilla derecha normal, sensibilidad y motor mediana, sensibilidad motora ulnar y amplitudes y velocidades sensibles nerviosas superficiales peroneas. La velocidad nerviosa peroneal motora derecha fue de 38 m/sg (nl 41 m/sg) con una respuesta a 1 mlv (nl 2,2 mlv). La respuesta motora nerviosa peroneal motora izquierda no pudo ser obtenida. La velocidad nerviosa motora tibial derecha fue de 35 m/sg (nl 41 m/sg) con una respuesta de amplitud normal.

Las respuesta F, medianas, ulnares, peroneas y tibiales no pudieron ser obtenidas. No hubo evidencia de bloqueo en la conducción nerviosa. La electromiografía mostró fibrilaciones de ++ a +++, ondas positivas agudas y fasciculación en los músculos de las tres extremidades con un patrón de reclutamiento neurogénico.

Biopsia de médula ósea y la electroforesis por inmunofijación sérica de proteínas, las inmunoglobulinas cuantitativas, función tiroidea, y así como el recuento hemático completo fueron normales. El mielograma completo fue también normal. Fue tratado con prednisona a dosis de 80 mg / día.

Se realiza scan de galio que muestra actividad linfomatosa en región cervical izquierda.

Cinco meses después presentaba cuadriparesia flácida y queratitis expuesta del ojo derecho.

El paciente fallece 10 meses después del inicio del desorden neurológico, la orbita no fue examinada, la evidencia del linfoma fue de otro modo restringida al sistema nervioso involucrando

estudios *viscerales* de la médula ósea o de los nódulos linfáticos. Hubieron características histológicas de un linfoma histiocítico difuso mixto de células largas que también presentó tinción positiva para I-26. Fig 1.

Fig 1: Biopsia punción de masa retroperitoneal: la imagen muestra proliferación desordenada de células tumorales de estirpe linfoide, acompañadas de extensas áreas de hemorragia y necrosis.

Discusión

Las manifestaciones clínicas de nuestro paciente fueron similares a aquellas reportadas en 39 pacientes. La neuropatía periférica sensora motora fue aguda y rápidamente progresiva en 5 pacientes. Recordando el síndrome de guillain barre, neuropatía progresiva subaguda en 28 pacientes con recaída de neuropatía en un paciente, neuropatía ciática o peroneal en cuatro y síndrome de cauda equina en uno, siendo solo en un paciente sintomático. 19 pacientes equivalentes al 48% presentaban un linfoma sistémico ya conocido.

Frecuencia de la neuropatía periférica en linfomas.

En una serie de autopsias y/o biopsias la evidencia histopatológica de la invasión linfomatosa de los nervios periféricos fue demostrada en un 5% de pacientes con enfermedad de Hodgkin y en 15 de 41 (37%) de pacientes con Linfoma No Hodgkin, pero los datos clínicos *no se ofrecieron*. *Contrariamente* en otros análisis de autopsias de 52 casos de linfomas ninguno presentó infiltración nerviosa neoplásica.

Las evidencias histológicas de neuropatía periférica sin invasión tumoral fue notada en 28 de 30 pacientes (93%) con enfermedad de Hodgkin y en 17 de 22 pacientes (78%) de enfermedad No Hodgkin. Los infiltrados de células mononucleares no específicos se hallaban presentes en 5 de 30 (16%) de pacientes con enfermedad de hodking, comparados a un 12 de 22 pacientes (55%) con linfoma No hodgkin.

Linfoma orbitario.

En nuestro paciente el Síndrome de Apex Orbitario precedió clínicamente al hallazgo de la neurolinfomatosis y de linfoma orbitario. En otro paciente no hubo infiltración linfomatosa de nervios ciliares ni de ganglios ciliares en autopsias, con signos pupilares de Argyll Robertson bilateral, ataxia de extremidad y arreflexia tendinosa.

En otro paciente con Linfoma No Hodgkin, el linfoma orbitario precedió análogamente al descubrimiento del linfoma leptomeníngeo por cinco años. Aquel paciente también presentaba evidencia clínica y de biopsia de esclerosis lateral amiotrófica con paraproteinemia de inmunoglobulina M.

En autopsias el linfoma fue restringido a las leptomeninges y a las raíces sin invasión del parénquima o de nervios periféricos.

Síndrome de Guillain-Barre.

La neuropatía fue denominada Síndrome de Guillain-Barre en cinco pacientes y no de neurolinfomatosis debido a que se presentó una debilidad rápidamente progresiva en extremidades en alrededor de 15 a 42 días, que progresó a paraplejía flácida arrefléxica cuadruplejía con variable pérdida de sensibilidad, incontinencia de esfínteres e insuficiencia respiratoria. El fluido cerebro espinal fue completamente normal. En un solo caso, tres pacientes presentaban 15 o menos células y uno presentaba 80 células, todos los cuatro presentaban aumento del contenido de proteínas con una media de 610 mg/dl la muerte resultó de 4 a 12 semanas con una media de 8 semanas posterior a la aparición de los síntomas y fue atribuido a complicaciones cardiopulmonares en la autopsia. La evidencia de la neurolinfomatosis fue hallada en todo los 5, los cuatro pacientes con contenidos anormales en líquido cerebroespinal presentaban infiltración difusa leptomeníngea.

Un paciente con fluido espinal normal presentó infiltrados tumorales en los nervios periféricos. (referencia 9)

Relación con el Linfoma Primario Leptomeníngeo.

Algunos pacientes con neurolinfomatosis pueden ser clínicamente indistinguibles de pacientes con linfomas leptomeníngeos llamado Linfoma Primario Leptomeníngeo. De aquellos 9 pacientes, 7 presentaban paraplejía subaguda y arreflexia en asociación con parálisis de los nervios craneales, pérdida de la sensibilidad, aumento del contenido proteico cerebro espinal por encima de 100 mg/dl y pleocitosis cerebroespinal linfocítica. Estos hallazgos fueron típicos de la neurolinfomatosis. Todos tenían estudios electrodiagnósticos que demostraban polirradiculopatías. Ninguno tenía estudio de autopsia y los nervios periféricos no fueron estudiados. Patológicamente, y debido a esto, es imposible estimar la frecuencia de la invasión nerviosa directa en aquellas series.

Algunos pacientes con linfomas leptomeníngeos pueden presentar eventualmente evidencia patológica de neurolinfomatosis aún cuando la neuropatía es asintomática, por ejemplo los infiltrados tumorales de nervios periféricos extensamente y leptomeníngeos fueron hallados en autopsias en pacientes con linfomas leptomeníngeos los cuales tenían dolor de cabeza, papiledema, y parálisis nerviosa del VI par, pero no hubo manifestaciones clínicas de neuropatías hasta el término de curso de su enfermedad tanto en la neurolinfomatosis y en el linfoma leptomeníngeo primario. Existe una alta frecuencia de expresión tumoral de células B incluidos 9 de los 12 pacientes con neurolinfomatosis, es decir, 75% de aquellos estudiados para marcadores celulares y en los 4 estudiados con linfoma leptomeníngeos primarios. Esto llevó a las posibilidades de una patogénesis común la cual incluye la predilección de áreas superpuestas del sistema nervioso. Otra similitud en ambos desórdenes es la relativa diseminación en el parénquima cerebral.

Las lesiones cerebrales fueron halladas en solo dos de los 39, es decir, 5% de los pacientes con neurolinfomatosis caso 1 de la referencia 14 en nuestro paciente con citología positiva.

Neuronopatía.-

Tres pacientes tenían fasciculaciones clínicas visibles, aumentando la posibilidad de una enfermedad concomitante del pericarion, enfermedad de la neurona motora a la que se añadió la neuropatía periférica.(13). En 20 pacientes se halló cromatolisis de la célula del cuerno del cordón espinal anterior en estudios postmortem, otro paciente presentó una disminución moderada en el número de estas células. Estos hallazgos no pueden claramente discriminar entre los cambios hormonales de la degeneración walleriana o de un desorden del pericarion.

Patogénesis de la infiltración tumoral en la neurolinfomatosis.-

Existen al menos dos formas de que el linfoma pueda ganar acceso a los nervios periféricos (referencias 2,11):

Primero, el linfoma sistémico puede metastatizar por ruta hematogena. En dos pacientes se evidenció histológicamente invasión a los vasos sanguíneos epineuronales, y en un paciente con angioendoteliomatosis maligna hubo metastasis tumoral intraluminal.

Segundo, el linfoma puede disecarse a lo largo de las fibras nerviosas de las leptomeninges de los ganglios de las raíces dorsales, y de las raíces espinales nerviosas tal como fue postulado en un paciente con Linfoma Leptomeníngeo Difuso. La infiltración tumoral focal puede resultar en una compresión focal la cual conlleva a isquemia, degeneración o desmielinización pudiendo las células secretar linfoquinas nocivas. (6,15).

Mecanismos paraneoplásicos

El moderno interés de los desórdenes neurológicos paraneoplásicos comenzó con los tempranos reportes de Denny-Brown y Wyburn-mason, ambos describieron similares pacientes con neuropatía sensitiva y con carcinoma pulmonar broncogénico. Guichard y colaboradores introdujeron el término paraneoplásico en consideración a tres pacientes con carcinomas sistémicos y con Neuropatía Subaguda Sensora Motora, la enfermedad paraneoplásica neurológica fue atribuida a una patogénesis autoinmune o mediada por un virus; por consiguiente excluyendo los posibles efectos directos de una infiltración tumoral. Existen tres posibles consideraciones para la patogénesis de la neuropatía a la neurolinfomatosis.

1. La neuropatía periférica puede ser causada por un anticuerpo el cual es generado contra el antígeno tumoral específico y que reacciona cruzadamente con componentes nerviosos periféricos. Por ejemplo: el anticuerpo anti-hu es hallado en pacientes con neuropatía sensitiva subaguda, un síndrome usualmente asociado con cáncer pulmonar de células pequeñas pero que también ha sido visto en pacientes con linfoma. (1,3)

2. La neuropatía periférica puede ser causada por un anticuerpo o paraproteína la cual es secretada por el linfoma. En 5 pacientes con neurolinfomatosis se hallaron células malignas de estirpe B en la superficie de inmunoglobulinas citoplasmáticas las cuales pueden ligar los antígenos nerviosos de un paciente con linfoma maligno que tenía neuropatía sensitiva, paraproteinemia, inmunoglobulina M de tipo kappa, paraglicoproteínas asociadas

a mielinas y dos paraglicolípidos ácidos .

En otro paciente con lfc, hubo neuropatías motora con conducción bloqueada y paraproteinemia Ig G kappa. El tratamiento del tumor resulto con una mejoría sustancial de desorden neurológico. (16)

3. La neuropatía y el tumor pudieron tener un origen común debido a un retrovirus o a otro virus neurotrópico y oncogénico. Por ejemplo: dos pacientes con neurolinfomatosis fueron seropositivos para el virus HIV, incluido uno con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y uno con complejo relacionado al sida, en otro hubo sero positividad para el virus tipo uno linfotrópico T humano. La inmunodeficiencia viralmente inducida pudo haber sido el huesped susceptible para otro virus oncogénico o neurotrópico.(7)

Bibliografía

1. Gemignani F, Marchesi G, Di Giovanni G, et al. Low grade non Hodgkin B-cell lymphoma presenting as sensory neuropathy. *Eur Neurol* 1996; 36 (3): 138-141.
2. Gherardi R, Gaulard P, Prost C, et al. T-cell lymphoma revealed by neuropathy: a report of two cases with an immunohistologic study on lymph node and nerve biopsies. *Cancer* 1986; 58: 2710-2716.
3. Gordon PH, Younger DS. Neurolymphomatosis. *Neurology* 1996; 46 (4): 1191-1192.
4. Krendel DA, Stahl RL, Chan WC. Lymphomatous polyneuropathy: biopsy of clinically involved nerve and successful treatment. *Arch Neurol* 1991; 48: 330-332.
5. Kuroda Y, Nakata H, Kakigi R, et al. Human neurolymphomatosis by adult T-cell leukemia. *Neurology* 1989; 39: 144-146.
6. Grisgold W, Jellinger K, Lutz D. Human neurolymphomatosis in a patient with chronic lymphatic leukemia. *Clin Neuropathol* 1990; 9: 224-230.
7. Lachance DH, O'Neill BP, Macdonald DR, et al. Primary leptomeningeal lymphoma: report of 9 cases, diagnosis with immunocytochemical analysis, and review of the literature. *Neurology* 1991; 41: 95-100.
8. Mauney M, Sciotto CG. Primary malignant lymphoma of the cauda equina. *Am J Surg Pathol* 1983; 7: 185-190.
9. Purohit DP, Dick DJ, Perry RH, et al. Solitary extranodal lymphoma of sciatic nerve. *J Neurol Sci* 1986; 74: 23-24.
10. Quinones A, Friedlander RM, Boyer PJ. Solitary sciatic nerve lymphoma as an initial manifestation of diffuse neurolymphomatosis: case report and review of the literature. *J Neurosurg* 2000; 92 (1): 165-169.
11. Shoenfeld Y, Aderka D, Sandbank U, et al. Fatal peripheral neurolymphomatosis after remission of histiocytic lymphoma. *Neurology* 1983; 33: 243-245.
12. Sumi SM, Farrell DF, Knauss TA. Lymphoma and leukemia manifested by steroid responsive polyneuropathy. *Arch of Neurology* 1983; 40: 577-582.
13. Van den Bent MJ, De Bruin HG, Beun GD, et al. Neurolymphomatosis of the median nerve. *Neurology* 1995; 45 (7): 1403-1405.
14. Van den Bent MJ, De Bruin HG, Bos GM, et al. Negative sural nerve biopsy in neurolymphomatosis. *J Neurol* 1999; 246 (12): 1159-1163.
15. Younger DS, Rowland LP, Latov N, et al. Lymphoma, motor neuron diseases, and amyotrophic lateral sclerosis. *Ann Neurol* 1991; 29: 78-86.
16. Zuber M, Gherardi R, Imbert M, et al. Peripheral neuropathy with distal nerve infiltration revealing a diffuse pleiomorphic malignant lymphoma. *J Neurol* 1987; 235: 61-62.